

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)
C. C. P. 723-61 . MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tel. M2 58-72

3ème année

N° 22

23 Mai 1955

Deuxième édition régionale n° 5

A V E R T I S S E M E N T S

Zones V et VI
Zone III (Aveyron-Lozère)

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Les premières taches de Mildiou ont été observées sur les cultures des vallées du Lot, du Dourdou, de l'Aveyron, du Tarn et de l'Altier. Il s'agit le plus souvent de cultures irriguées.

Traiter les plantes qui approchent de la floraison avec :

- Bouillie bordelaise
- Sulfate basique de cuivre
- Oxychlorure de cuivre
- Oxyde cuivreux.

Il est actuellement inutile de traiter les plantations du Ségala (Aveyron), ou des plateaux lozériens, ainsi que celles du pays de Sault (Aude) et de la région de la Salvétat (Hérault).

MILDIOU DE LA VIGNE

Renouveler le traitement préconisé le 13 mai, partout où il a été lavé par les récentes pluies.

CIGARIER

Ce parasite étant fréquemment observé dans le vignoble aveyronnais, ajouter un produit arsenical à la bouillie destinée à prévenir le mildiou.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

P. BERVILLE

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

L.L.TROUILLON